

Sesión virtual 07

Actualización en indización de documentos según Metodología LILACS

Tarea 6: Revisión de la Indización del artículo “Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey”

Maria Anália da Conceição

Sueli Mitiko Yano Suga

Fuentes de Información Referenciales/PFI

BIREME/OPS/OMS

28 setiembre, 2017

Objetivo

Aclarar las dudas de los participantes sobre la indización del artículo de la Tarea 6 – Calificadores más Frecuentes

Proceso

- **Lectura Técnica**

- Análisis del artículo y identificación de Tipo de Publicación (TP) y Pre-codificados (Precod);
- Análisis del título y partes principales del artículo e identificación de los asuntos principales.

- **Selección de los descriptores/calificadores Primarios**

- Búsqueda de los descriptores en DeCS;
- Lectura de las notas y verificación de la jerarquía;
- Comparación de las definiciones de los términos.

Proceso

- **Selección de los secundarios (descriptores/calificadores y descriptores sin calificadores)**
 - Análisis e identificación dos aspectos (calificadores) secundarios de las enfermedades;
 - Análisis de los términos del título que no fueron indizados como primario y lectura de las notas;
 - Análisis e identificación de otros descriptores secundarios relevantes como técnicas y otros.

Análisis preliminar del artículo

Rev. argent. dermatol. vol.98 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires mar. 2017



SECTOR CASOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS

Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey

CASO CLÍNICO



Hombre, de 70 años con antecedentes de cáncer de colon operado hace veinte años, hipertensión arterial esencial. Presenta aparición recurrente de lesiones eritematosas erosionadas, costrosas y malolientes en ingle, axilas y tronco, de cinco años de evolución ([Figs 1 y 2](#)), recibiendo tratamiento con antifúngicos y corticoides tópicos sin respuesta. Se sospecha de Hailey-Hailey, por lo que se le realiza una biopsia que muestra hendidura suprabasal del epitelio, con queratinocitos acantolíticos compatibles con pénfigo de Hailey-Hailey ([Figs 3 y 4](#)). Se inicia tratamiento con cefadroxilo por siete días y prednisona 40 mg diarios durante diez días, disminuyendo progresivamente hasta dosis de mantención de 15 mg diarios, con buena respuesta.

Confirmado que es el TP Informes de Casos.
Vamos al DeCS y buscamos por la palabra CASO
os e hipertensión

Tipo de Publicación: Informe de casos

Precodificado: Humanos; Masculino; Anciano

Seleccionando los descriptores/calificadores Primarios

Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey

- Analizar el título y identificar los descriptores primarios.
- Leer la introducción apenas para conocer el asunto.
- Como es un Informe de Casos, verificar lo que realmente fue estudiado.

Vamos al artículo y al DeCS:

- http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000100004
- <http://decs.bvs.br/>

Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey

Empezando por Pénfigo de Hailey-Hailey

Índice Permutado

Pesquisa sobre:HAIL

Descritores Encontrados: 1

Mostrando: 1 .. 1

De: ENFERMEDAD DE HAILEY-HAILEY

Até: ENFERMEDAD DE HAILEY-HAILEY

ENFERMEDAD DE HAILEY-HAILEY

Descritor *Espanhol*: **Pénfigo Familiar Benigno**

Descritor *Português*: **Pênfigo Familiar Benigno**

Sinónimos *Espanhol*: Pénfigo Crónico Benigno Familiar
Enfermedad de Hailey-Hailey

Categoría: [C16.320.850.700](#)
[C17.800.827.700](#)
[C17.800.865.858](#)

JERARQUÍA

Definição *Espanhol*: Trastorno de la piel heredado autosómica e dominantemente y caracterizado por erupciones recurrentes de vesículas y BULLAS principalmente en el cuello, la axilas y la ingle. Mutaciones en el gen ATP2C1 (que codifica la vía secretora Ca²⁺⁺/Mn²⁺⁺ ATPasa 1 (SPCA1)) causa esta enfermedad. Es clínica y histológicamente similar a la ENFERMEDAD DE DARIER - ambas tienen DESMOSOMAS anormales y inestables entre los QUERATINOCITOS y las ATPASAS TRANSPORTADORAS DE CALCIO defectuosas. No está relacionada al PÉNFIGO VULGAR a pesar de las semejanzas con dicha enfermedad.

Qualificadores Permitidos *Espanhol*:

SU cirugía	CL clasificación
CO complicaciones	DG diagnoístico por imagen
DI diagnoístico	DH dietoterapia
EC economía	EM embriología
NU enfermería	EN enzimología
EP epidemiología	ET etiología
EH etnología	PP fisiopatología
GE genética	HI historia
CI inducido químicamente	IM inmunología
CF líquido ceforraquídeo	ME metabolismo
MI microbiología	MO mortalidad
UR orina	PS parasitología
PA patología	PC prevención & control
PX psicología	RT radioterapia
RH rehabilitación	BL sangre
TH terapia	DT tratamiento farmacológico
VE veterinaria	VI virología

Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey

- ¿Hay que indizar Enfermedades Cutáneas Genéticas, Enfermedades de la Piel o otras de la jerarquía?

No. Sólo se indiza el más específico: Pénfigo Familiar Benigno como descriptor primario

- ¿Hay más descriptores primarios?



El asunto “**Dermatosis intertriginosa**” no fue indizado.

Vamos al DeCS!

Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey

Índice Permutado

Pesquisa sobre:INTERTR

Descritores Encontrados:6

Mostrando:1 .. 6

De:FRACTURA INTERTROCANTERIANA

Até:ZONA DE CONVERGENCIA INTERTRO

FRACTURA INTERTROCANTERIANA
FRACTURAS INTERTROCANTEREAS
FRACTURAS INTERTROCANTERIANAS
FRACTURAS INTERTROCANTERICAS
INTERTRIGO
ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL

Descritor *Espanhol*: **Intertrigo**

Descritor *Português*: **Intertrigo**

Categoria: [C17.800.174.640](#)
[C17.800.815.650](#)

JERARQUÍA

Definição *Espanhol*: Dermatitis superficial que ocurre sobre las superficies cutáneas que están en contacto entre sí, como son las axilas, los pliegues del cuello, la región interglútea, entre los dedos, etc. La obesidad es un factor predisponente. La afección se produce por humedad y fricción y se caracteriza por eritema, maceración, quemaduras, y exudados.

Nota de Indexação *Espanhol*: una dermatitis de los pliegues de la piel

Qualificadores Permitidos *Espanhol*:

SU cirugía	CL clasificación
CO complicaciones	CN congénito
DG diagnóstico por imagen	DI diagnóstico
DH dietoterapia	EC economía
EM embriología	NU enfermería
EN enzimología	EP epidemiología
ET etiología	EH etnología
PP fisiopatología	GE genética
HI historia	CI inducido químicamente
IM inmunología	CF líquido cefalorraquídeo
ME metabolismo	MI microbiología
MO mortalidad	UR orina
PS parasitología	PA patología
PC prevención & control	PX psicología
RT radioterapia	RH rehabilitación
BL sangre	TH terapia
DT tratamiento farmacológico	VE veterinaria
VI virología	

Comparación de los descriptores

Descriptor *Espanhol*: **Intertrigo**

Descriptor *Português*: **Intertrigo**

Categoria: [C17.800.174.640](#)
[C17.800.815.650](#)

Definição *Espanhol*: [Dermatitis](#) superficial que ocurre sobre las superficies cutáneas que están en contacto entre sí, como son las axilas, los pliegues del [cuello](#), la región interglútea, entre los dedos, etc. La [obesidad](#) es un factor predisponente. La afección se produce por [humedad](#) y [fricción](#) y se caracteriza por [eritema](#), maceración, [quemaduras](#), y exudados.

Nota de Indexação *Espanhol*: una [dermatitis](#) de los pliegues de la piel

Descriptor *Espanhol*: **Pénfigo Familiar Benigno**

Descriptor *Português*: **Pênfigo Familiar Benigno**

Sinônimos *Espanhol*: Pénfigo Crónico Benigno Familiar
Enfermedad de Hailey-Hailey

Categoria: [C16.320.850.700](#)
[C17.800.827.700](#)
[C17.800.865.858](#)

Definição *Espanhol*: Trastorno de la piel heredado autosómica e predominantemente y caracterizado por erupciones recurrentes de vesículas y BULLAS principalmente en el [cuello](#), la axilas y la ingle. Mutaciones en el gen ATP2C1 (que codifica la vía secretora Ca²⁺⁺/Mn²⁺⁺ ATPasa 1 (SPCA1)) causa esta [enfermedad](#). Es clínica y histológicamente [similar](#) a la [ENFERMEDAD DE DARIER](#) - ambas tienen [DESMOSOMAS](#) anormales y inestables entre los [QUERATINOCITOS](#) y las [ATPASAS TRANSPORTADORAS DE CALCIO](#) defectuosas. No está relacionada al [PÉNFIGO VULGAR](#) a pesar de las semejanzas con dicha [enfermedad](#).

Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey

Descriptor primario:

Pénfigo Familiar Benigno

Intertrigo

¿Cual es el aspecto principal?



Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey


¿Cuál es el aspecto principal?

El calificador más apropiado es /patol, por las fotos, realización de **biopsia** (vea nota de DeCS), a palabra “lesión” no sentido de daño celular y también la sesión del artículo.

Descriptor primario:

Pénfigo Familiar Benigno/patol

Intertrigo/patol



Seleccionando los descriptores secundarios

Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey

¿Hay aspectos/calificadores secundarios de las enfermedades?

- Como fue realizado **diagnóstico diferencial**, las dos enfermedades deben ser indizadas con /diag.

¿Hay otros descriptores secundarios?

- **Enfermedad Crónica:** ver si las 2 enfermedades tienen carácter crónico.
- **Técnica:** el diagnóstico de certeza fue por **biopsia** (ver nota). Entonces, indizar Piel/patol como secundario porque no hubo destaque
- **Diagnóstico Diferencial** (ver nota).

Seleccionando los descriptores secundarios

Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey

¿Hay otros descriptores o calificadores de las enfermedades que no fueron indizados?

- Hubo información (2 líneas) sobre tratamiento de Pénfigo Familiar Benigno con drogas, que consideramos irrelevante para recuperación y no indizamos ni como secundario.
- Algunas personas indizaron este aspecto primario, no es el caso, porque no está en destaque en el Título y no fue confirmado en la Conclusión.
- ¿ Hay que indizar axilas o ingle?

Dermatosis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey

Descriptores Primarios:

Intertrigo/patol

Pénfigo Familiar Benigno/patol

Descriptores Secundarios:

Intertrigo/diag

Pénfigo Familiar Benigno/diag

Diagnóstico Diferencial

Enfermedad Crónica

Piel/patol

Biopsia

Tipo de Publicación:

Informes de Casos

*La edad aparece en CASO CLÍNICO 'Hombre, de 70 años...'

Pre-codificados:

Humano

Masculino

Anciano

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000100004

Consideraciones finales

- La lectura técnica de **Informes de Casos** es un poco distinta de la mayoría de los artículos, pues grande parte no tienen objetivo.
- El indizador debe considerar como fuente principal para selección de descriptores, el Título y partes donde el autor relata lo que fue investigado en la época del informe.
- En los informes de casos se usa pocos descriptores.
- Seleccionar solamente los descriptores más específicos discutidos (mirar siempre la jerarquía).
- Cumplir la regla general de usar apenas 1 calificador en un mismo descriptor como primario y dos como secundario.
- Revisar los descriptores seleccionados.

Gracias!

Dudas y comentarios: red-bvs@googlegroups.com

REFERENCIAS

BIREME. Qualificadores: módulo 2 unidade 2. In: Curso Online Metodologia LILACS para a rede brasileira (2014). São Paulo: BIREME, 214. [Cita en 2017 Sept 21] Disponible en: https://cursos.campusvirtualsp.org/repository/coursefilearea/file.php/34/storyline/modulo2unidade2/story_html5.html

BIREME. Biblioteca Virtual em Saúde. Manual de indexação de documentos para a base de dados LILACS: 9. **Calificadores** [Internet]. São Paulo: Bireme, 2008. [Cita en 2017 Sept 21]. Disponível em: <<http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/download/E/LILACS-4-ManualIndexacao-es.pdf>>.

TERC TELIAS, F et al . Dermatitis intertriginosa crónica de aparición tardía: pénfigo de Hailey-Hailey. Rev. argent. dermatol., Ciudad Autónoma de Buenos Aires , v. 98, n. 1, p. 21-26, marzo 2017. [Cita en 2017 Sept 28]. Disponible en <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2017000100004&lng=es&nrm=iso>.